

GUÍA DE AVES PARA LA RESERVA MUNICIPAL "CUEVA DE LOS LEONES"

Fotografías de autoría de Carlos Soulier, Norma Castro y Jorge A. Espié.

¡Agradecemos su colaboración!

Calandria grande (*Mimus saturninus*)

Ave de 25 cm de largo. Presenta leve estriado dorsal. Cola larga, semierecta, con vexilo externo y ancho. Ceja prominente blanca y vientre también blancuzco.



Calandria real (*Mimus triurus*)

Ave de 20 cm. Posee dorso gris parduzco, rabadilla rufa (de color rojo o bermejo). Faja alar notable, más aún cuando está en vuelo. Con flancos ocráceos.



Jilguero dorado (*Sicalis flaveola-2R*)

Ave de 12 cm de largo. Suele verse formando bandadas. Anida en el suelo. Tiene dorso ocráceo con muchas estrías color pardo. Rabadilla color oliva. El párpado y el vientre son de color amarillo.



La hembra es similar solo que de coloración más pálida.

Loica común (*Sturnella loyca-4R*)

Ave de 22 cm de longitud. Exhibe ceja blanca que comienza siendo roja. Presenta tapadas color blanco.

La hembra tiene la garganta color blanco y flanqueada por fajas negras.



Tordo renegrado (*Molothrus bonariensis*)

Ave de 19 cm de longitud. Forma grandes bandadas.

Hembra de coloración gris parduzca y macho de color negro, y de brillo violeta.



Chingolo común (*Zonotrichia capensis-7R*)

Longitud promedio de 12 cm. Presenta un semicopete en cabeza, coloración grisácea en mejillas flanqueadas de negro. Cuello dorsal canela, leve semicollar negro y canela. Ventral estriado de negro.



Benteveo común (*Pitangus sulphuratus-2R*)

Ave de 22 cm de largo. De hábito pescador y halconeo. Presenta pico robusto color negro. Banda oscura cubre altura de los ojos, ceja blanca y gargantilla blancuzca. Vientre amarillento. Filetes color canela en remeras alares.



Cotorra (*Myiopsitta monacha-3R*)


Longitud de 27 cm. Se las observa en bandadas. Vive y habita en grandes nidos comunes. Es de color verde, tiene amplia frente y garganta color gris, pico anaranjado, pecho ceniciento ondeado de blancuzco y remeras alares de color azul.



Cortarramas (*Phytotoma rutila-2R*)

Ave de 17 cm de longitud. Cabeza con copete, de amplia frente y el vientre color rufo. Dorso plumizo sin estrías. Cola negra con ápice externo blanco.


La hembra presenta un estriado dorsal más notable.



Churrinche (*Pyrocephalus rubinus*)

Ave de 13 cm de largo. Notable corona, semicopete y ventral color rojo, el resto de su cuerpo es negruzco.

La hembra es poco llamativa, dorso gris parduzco. Pecho estriado de gris y la zona subcaudal es rosácea.



Paloma picazuró (*Columba picazuro*)

Longitud de 34 cm. Cuello largo, cabeza y pecho vinosos. Iris castaño. Apretados filetes celeste metálicos en cuello dorsal. Medialuna blanca en cubierta (más notable en vuelo). Resto del cuerpo color plumizo.



Torcacita (*Columbina picui*)

Ave de 15 cm de longitud. Cabeza y cuellos cenicientos. Cubiertas con líneas negras. Faja alar longitudinal blanca, contrastada con remeras negras. Cola algo larga, blanca y con timoneras centrales negras. Vientre blancuzco rosáceo.



Ratona común (*Troglodytes aedon*-5R)

Ave pequeña de 10 cm. Es de color pardo, presenta sus alas y la cola castañas.



Carancho (*Polyborus plancus*-2R)

Ave de 55 cm de longitud. Abdomen y corona color negruzco. Dorso y pecho barrados, garganta ocrácea. Cola blancuzca con ápice negro. Gran zona blanca en base de plumas primarias.



Tijereta (*Tyrannus tyrannus*)

Ave con 38 cm de longitud. Cabeza y larguísima cola negras. Corona oculta color amarillo. Dorso grisáceo y vientre blanco.



Lechucita pampa (*Athene cunicularia-3R*)

Ave de 25 cm de longitud. De hábitos terrícolas, por lo general se observa en postes, junto a cuevas o cerca de vizcacheras. Diurna. Caza halconeando. No presenta orejas, patas largas blancuzcas. Dorso pardo con pecas blancas, vientre más o menos manchado.



Petitero chico (*Saltatricula multicolor*)

Tamaño de 15 cm. Presenta cola negra con ápice externo blanco. En la cabeza tiene ceja post-ocular blanca. Cara de color negro, continuando a los lados y rodeando la garganta de coloración blanca. Collar color gris.



Ventre canela con centro blanco. Pico amarillo anaranjado con culmen negro.

Verdón (*Embernagra platensis-3R*)

Ave de unos 20 cm de longitud. Se lo observa en parejas. Tiene cabeza color gris, dorso oliváceo. Alas y cola amarillo verdosas, con notable pico color anaranjado.



Monjita blanca (*Xolmis irupero*)

Ave con tamaño de 17 cm. Coloración blanca notable, posee remeras y ápice caudal de color negro.



Piojito común (*Serpophaga subcristata*)

Ave de 9 cm. Presenta una corona plumiza con mancha blanca oculta, dorso gris algo oliváceo. Filetes claros en cubiertas negruzcas. Pecho gris que pasa a amarillento en resto del vientre.



Cabecitanegra común (*Carduelis magellanica*-4R)

Ave de 12 cm de longitud. Presenta un característico capuchón negro que incluye un pequeño babero. Tiene el dorso de coloración olivácea apenas estriado. La rabadilla y el vientre amarillos.

La hembra es de color más oliváceo y no presenta capuchón en la cabeza.



Dragón (*Pseudoleistes virescens*)

Tamaño de 21 cm. Suele verse en bandadas. Presenta el dorso (incluso rabadilla), pecho y abdomen pardo oliváceo. Los hombros, las tapadas y el resto del cuerpo es de coloración amarilla.



Pico de plata (*Hymenops perspicillata-2R*)

Ave de 13 cm de largo. Tiene hábitos terrícolas, se exhibe en matas y postes. Es de coloración negra, con primarias blancas (notables en vuelo). Tiene el pico y el periocular color amarillento.

La hembra es parda estriado, con zona alar rufa (notable en vuelo).



Milano blanco (*Elanus leucurus*)

Ave de 35 cm. Es de coloración blanca, presenta el dorso gris y color negro en la zona ocular, las cubiertas primarias y mancha en tapadas alares.



Monjita coronada (*Xolmis coronata*)

Tamaño de 20 cm.
Posee corona y faja ocular negras, separadas por una vincha blanca. Dorso gris pardusco. Remeras y cola negras. Filetes en cubierta y banda alar color blanco.



Teru-teru común (*Vanellus chilensis-3R*)

Ave de 31 cm de largo. Tiene el dorso pardusco, brillo verde y morado en cubiertas. Frente con fino copete negro en nuca y de pecho negro. Remeras y faja caudal color negras, notables en vuelo. El resto del cuerpo es de color blanco. Los



párpados, iris, pico y patas son de coloración rojiza.

Leñatero (*Anumbius annumbi*)

Tamaño de 15 cm. Se caracteriza por formar nido expuesto y voluminoso con palos. Presenta su frente color castaño, dorsal estriado. Cola negra con faja apical blanca. Garganta blanca rodeada de puntos negros.¹

